

## Kvinder

	Erhvervs- aktive	Efterløns- modtagere	1)	Førtids- pensionister	2)
<b>Livskvalitet</b>					
Godt selv vurderet helbred	88,7	79,8	*	35,9	*
God fysisk mobilitet	89,2	84,6		43,7	*
	86,3	81,6		72,1	*
Gode kommunikations-færdigheder					
<b>Sygelighed</b>					
Langvarig sygdom	37,4	41,5		91,6	*
Meget hæmmet af langvarig sygdom	4,0	9,4	*	52,1	*
Meget generende symptomer og gener inden for en 14-dages periode	40,2	40,5		70,3	*
Har været begrænset i at udføre daglige aktiviteter inden for en 14-dages periode	8,7	9,3		37,3	*
Varige aktivitetsbegrænsninger	3,5	3,5		30,6	*
<b>Brug af sundheds- væsenets ydelser</b>					
Praktiserende læge inden for en 3-måneders periode	33,6	44,5	*	61,4	*
Brug af receptmedicin inden for en 14-dages periode	49,6	53,5		89,0	*
Brug af håndkøbsmedicin inden for en 14-dages periode	27,5	34,6		42,8	*
Tager regelmæssigt medicin	42,8	52,2		90,8	*
<b>Sociodemografi</b>					
Gift/samlevende	69,1	79,7	*	64,0	
Lang uddannelse	62,3	36,5	*	28,3	*
Kort uddannelse	12,9	33,3	*	36,5	*
<b>Antal svarpersoner</b>	<b>167</b>	<b>232</b>		<b>99</b>	

Kilde: Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005, Statens Institut for Folkesundhed.

1) Statistisk signifikant forskel ( $p < 0,05$ ) mellem efterlønsmodtagere og erhvervsaktive

2) Statistisk signifikant forskel ( $p < 0,05$ ) mellem førtidspensionister og erhvervsaktive